

# **GUIDE**

## **Cathéter central introduit périphériquement (CCIP)**



The Ottawa Hospital | L'Hôpital  
d'Ottawa

### **Avertissement**

*Ces renseignements ont été préparés par L'Hôpital d'Ottawa et ne visent pas à remplacer les conseils d'un fournisseur de soins de santé qualifié. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé, qui pourra déterminer si l'information s'applique à votre situation particulière.*

**P748 (03/2009)**

Imprimé à L'Hôpital d'Ottawa

Programme de cathéter central introduit périphériquement  
(CCIP)

L'Hôpital d'Ottawa

Ottawa ON

N° tél. : 613-737-8899, poste 73237

Votre médecin a demandé qu'on vous installe un cathéter central introduit périphériquement (CCIP). Ce cathéter nous permettra de vous donner des médicaments et des liquides par voie intraveineuse et d'obtenir des prises de sang.


Prenez quelques minutes pour lire ce document avant l'installation de votre cathéter. À la fin du document, vous trouverez une section où vous pourrez noter vos commentaires ou vos questions. Vous pouvez en discuter avec votre infirmière ou médecin. Un membre du Programme de CCIP est aussi disponible pour répondre à vos questions.

*Merci.*

# ***Cathéter central introduit périphériquement (CCIP)***

- C'est un cathéter intraveineux spécial qui est mou et flexible. On l'insère dans une veine de votre bras et on l'avance jusqu'à une plus grosse veine située dans votre poitrine, soit la veine cave supérieure.
- Un CCIP permet de vous donner des liquides, des médicaments, des produits sanguins et de prendre du sang.
- La plupart des gens ont besoin d'un CCIP pour quelques semaines ou quelques mois, mais un CCIP peut rester plus longtemps, au besoin.
- C'est une infirmière spécialement formée qui insère le CCIP à votre chevet ou dans une clinique.
- Vous serez avec l'infirmière qui insère votre CCIP pour environ 2 heures. La plupart des patients ressentent peu ou pas de douleur pendant l'insertion.

## ***Avant la procédure***


- Vous devez vous allonger et étendre le bras pendant environ une heure. L'infirmière essaiera de vous rendre le plus confortable possible.
- 
- Votre bras sera nettoyé avec une solution antiseptique et des serviettes stériles seront placées autour de votre bras et sur votre corps. L'infirmière portera un bonnet, un masque, une blouse et des gants stériles. Toutes ces mesures visent à prévenir les infections.
  - Un appareil d'échographie sera utilisé pour localiser une veine dans votre bras.

## ***Pendant la procédure***

- Un médicament sera injecté dans le haut de votre bras pour «geler» la région où le CCIP sera inséré. SVP dites-le à l'infirmière si vous êtes allergique à la lidocaïne ou à d'autres médicaments anesthésiques.
- L'infirmière insérera une aiguille dans votre veine. À ce moment, vous pourrez peut-être ressentir une certaine pression. Le cathéter sera ensuite avancé jusqu'à la plus grosse veine de votre poitrine: la veine cave supérieure. Vous ne sentirez pas le cathéter avancer dans votre veine.
- Le cathéter sera sécurisé à votre peau avec du ruban adhésif et sera recouvert d'un pansement.
- Vous passerez ensuite une radiographie pulmonaire pour localiser le bout du CCIP.
- Si nécessaire, l'infirmière repositionnera le CCIP pour avoir le bout du cathéter au bon endroit.
- Lorsque le bout du cathéter est bien situé, celui-ci sera prêt à être utilisé.

Il faut faire bien attention de garder votre CCIP propre et en bon état. Le CCIP ne peut être utilisé que pour le traitement pour lequel il a été inséré (médicaments et liquides). Pendant que vous êtes à l'hôpital, l'infirmière s'occupera de votre CCIP. Si vous

retournez chez vous avec votre CCIP, une infirmière vous rendra visite et vous aidera à en prendre soin. ***Il est très important que vous mainteniez votre CCIP et les fournitures à l'abri des microbes.***



## ***Pansement***

- Il y aura peut-être un peu de saignement les premières 24 heures après l'insertion.
- L'infirmière changera le pansement en dans de 48 heures et ensuite aux 6 à 7 jours régulièrement.
- Gardez le pansement **propre** et **sec**. (Cela veut dire aucune baignade, et lorsque vous prenez une douche, il faut protéger le pansement avec une pellicule ou un sac de plastique).
- **Avisez l'infirmière si le pansement est mouillé ou défait, car il faudra alors le changer.**
- L'infirmière irriguera régulièrement votre CCIP.

## ***Activités***

- Le CCIP ne devrait pas vous empêcher de faire vos activités à la maison et à l'extérieur. Selon votre condition physique, vous pourrez continuer la majorité de vos activités quotidiennes. Utilisez votre bras tant que vous vous sentez confortable.

## **Conseils pour ne pas endommager votre CCIP ou vos veines :**

- Il est important que votre CCIP reste dans la position où il a été placé. S'assurer que le CCIP est bien ancré, pour éviter d'accrocher le cathéter accidentellement.
- Évitez les activités qui vous amènent à bouger le bras de façon répétitive comme : pelleter, jardiner, faire du sport ou de l'exercice qui demande de bouger beaucoup les bras.
- Évitez de soulever des poids ou des objets lourds (comme un sac de pommes de terre de 10 livres).

**Appelez votre infirmière de soins à domicile ou médecin aussi tôt que possible si vous observez un des symptômes suivants :**

- Votre pansement devient mouillé ou défait.
- Changement de la longueur du cathéter qui dépasse à l'extérieur de votre corps.
- Votre CCIP est endommagé (replier le cathéter sur lui-même au-dessus de la partie endommagée, recouvrir d'une gaze stérile et attacher avec un ruban adhésif).
- Saignements excessifs (le pansement est plein de sang).
- Fièvre et/ou frissons.
- De la douleur, de la chaleur, de la rougeur ou de l'enflure dans votre bras, votre épaule ou dans votre cou du côté où votre CIPP est inséré.
- Du liquide coule de votre CIPP ou au point d'insertion du CIPP.

***Fin de la thérapie***

- Quand votre médecin jugera que vous n'avez plus besoin de votre CCIP, l'infirmière pourra retirer le CCIP à l'hôpital ou chez vous.
- Il n'y a aucun inconfort avec la procédure de retrait.
- La guérison se fait rapidement. Vous pourrez retirer le pansement ou la gaze après 1 à 2 jours.

Notes : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

